

INICIO DEL TRATAMIENTO

Quién es usted importa, especialmente en el interior. Así que manténgase fiel a usted mismo.

Un tratamiento completo para el VIH-1 de una pastilla

BIKTARVY® es una medicina recetada completa de 1 pastilla, una vez al día, que se utiliza para tratar el VIH-1 en adultos y niños que pesan al menos 55 libras (25 kg). Se puede usar en personas ya sea que estén:



Comenzando un tratamiento para el VIH-1 y nunca hayan tomado medicinas para el VIH-1 antes, o



Reemplazando sus medicinas actuales para el VIH-1 y cuyo proveedor de atención médica determine que cumplen con ciertos requisitos.

BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA. El VIH-1 es el virus que causa el SIDA.

BIKTARVY no debe tomarse con otras medicinas para el VIH-1.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de BIKTARVY?

BIKTARVY puede causar efectos secundarios graves:

- ▶ **Empeoramiento de la infección por hepatitis B (VHB).** Si tiene VIH-1 y VHB y deja de tomar BIKTARVY, su VHB puede empeorar repentinamente. No deje de tomar BIKTARVY sin hablar primero con su proveedor de atención médica, quien deberá controlar su salud.

¿Quién no debe tomar BIKTARVY?

No tome BIKTARVY si toma:

- ▶ dofetilida
- ▶ rifampicina
- ▶ cualquier otra medicina para tratar el VIH-1

¿Cuáles son los otros posibles efectos secundarios de BIKTARVY?

Los efectos secundarios graves de BIKTARVY también pueden incluir los siguientes:

- ▶ **Cambios en su sistema inmunitario.** Su sistema inmunitario puede hacerse más fuerte y comenzar a combatir infecciones. Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma

Cómo tomar BIKTARVY

Tome BIKTARVY exactamente como su proveedor de atención médica le indicó que lo tomara. No omita ninguna dosis.



1 pastilla, una vez al día



Se toma a cualquier hora del día



Con o sin alimentos

Para aprender más sobre BIKTARVY, hable con su proveedor de atención médica y visite BIKTARVY.com.

Haga clic para ver la sección “Información importante” acerca de BIKTARVY, que incluye advertencias importantes, en la página siguiente.

¿Cuáles son los otros posibles efectos secundarios de BIKTARVY? (continuación)

- nuevo después de comenzar a tomar BIKTARVY.
- ▶ **Problemas renales, incluida la insuficiencia renal.** Su proveedor de atención médica debe realizar análisis de sangre y orina para controlar sus riñones. Si desarrolla problemas renales nuevos o peores, puede indicarle que deje de tomar BIKTARVY.
- ▶ **Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica),** que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene estos síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.
- ▶ **Problemas hepáticos graves,** que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene

BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA

Debe continuar tomando sus medicinas para el VIH-1 para controlar la infección con VIH-1 y disminuir las enfermedades relacionadas con el VIH.

Evite hacer cosas que puedan contagiar la infección con VIH-1 a otras personas.

- ▶ No comparta elementos que puedan tener sangre o fluidos corporales, como agujas, otros equipos de inyección, hojas de afeitar o cepillos de dientes.
- ▶ Siempre utilice prácticas sexuales más seguras y use condones para disminuir la probabilidad de contacto sexual con fluidos corporales.

Consulte a su proveedor de atención médica si tiene preguntas sobre cómo prevenir la transmisión del VIH-1 a otras personas.

¿Cuáles son los otros posibles efectos secundarios de BIKTARVY? (continuación)

estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida de apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.

Los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY en estudios clínicos fueron diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de cabeza (5 %). Infórmele a su proveedor de atención médica si tiene efectos secundarios que le causan malestar o no desaparecen.

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar BIKTARVY?

- ▶ **Todos sus problemas de salud.** Asegúrese de informarle a su proveedor de atención médica si tiene o ha tenido algún problema renal o hepático, incluida la infección por el virus de la hepatitis.

- ▶ **Todas las medicinas que toma,** incluidas las medicinas recetadas y sin receta, los antiácidos, los laxantes, las vitaminas y los suplementos herbales.

APOYO MÓVIL TODOS LOS DÍAS

La aplicación Daily Charge® proporciona herramientas y recursos que pueden ayudar a brindar apoyo a su vida cotidiana con VIH-1, independientemente del tratamiento que siga.



Puede descargar la aplicación gratis en MyDailyCharge.com

¿Qué le debo informar a mi proveedor de atención médica antes de tomar BIKTARVY? (continuación)

BIKTARVY y otras medicinas pueden afectarse entre sí. Elabore una lista de todas sus medicinas y muéstresela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico, y pregunte si es seguro tomar BIKTARVY con todas sus otras medicinas.

- ▶ **Si está embarazada** o planea quedar embarazada. Se desconoce si BIKTARVY puede dañar al feto. Infórmele a su proveedor de atención médica si queda embarazada mientras toma BIKTARVY.
- ▶ **Si está amamantando** (lactando) o planea amamantar. No amamante. El VIH-1 puede transmitirse al bebé en la leche materna.

Se recomienda que le informe a la FDA acerca de los efectos secundarios negativos de las medicinas recetadas. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.



BIKTARVY®
bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets



BIKTARVY®

bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg tablets

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Esto es solo un breve resumen de información importante sobre BIKTARVY® y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica sobre su afección y su tratamiento.

(bik-TAR-vee)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE SOBRE BIKTARVY

BIKTARVY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- **Empeoramiento de la infección por hepatitis B (VHB).** Si tiene VIH-1 y VHB, su VHB puede empeorar repentinamente si deja de tomar BIKTARVY. No deje de tomar BIKTARVY sin hablar primero con su proveedor de atención médica, quien deberá controlar su salud de forma regular durante varios meses.

ACERCA DE BIKTARVY

BIKTARVY es una medicina recetada completa de 1 pastilla, una vez al día, que se utiliza para tratar el VIH-1 en adultos y niños que pesan al menos 55 libras (25 kg). Puede usarse ya sea en personas que nunca han tomado medicinas para el VIH-1 antes o en personas que están reemplazando sus medicinas actuales para el VIH-1 y cuyo proveedor de atención médica determina que cumplen con ciertos requisitos.

BIKTARVY no cura el VIH-1 ni el SIDA. El VIH-1 es el virus que causa el SIDA.

NO tome BIKTARVY si también toma una medicina que contiene:

- dofetilida
- rifampicina
- cualquier otra medicina para tratar el VIH-1

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE BIKTARVY

BIKTARVY puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:

- Aquellos que se describen en la sección “Información muy importante sobre BIKTARVY”.
- Cambios en su sistema inmunitario.
- Problemas renales nuevos o peores, incluida la insuficiencia renal.
- Demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica), que es una emergencia médica grave pero poco frecuente y que puede provocar la muerte. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene estos síntomas: debilidad o más cansancio que lo habitual, dolor muscular inusual, dificultad para respirar o respiración acelerada, dolor estomacal con náuseas y vómitos, manos y pies fríos o azulados, mareos o aturdimiento, o palpitaciones o latidos anormales.
- Problemas hepáticos graves, que en casos poco frecuentes pueden provocar la muerte. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene estos síntomas: color amarillento en la piel o la parte blanca de los ojos, orina oscura “color té”, heces claras, pérdida de apetito durante varios días o más, náuseas o dolor en la región estomacal.
- **Los efectos secundarios más comunes de BIKTARVY** en estudios clínicos fueron diarrea (6 %), náuseas (6 %) y dolor de cabeza (5 %).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BIKTARVY. Infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma nuevo durante el tratamiento con BIKTARVY.

Su proveedor de atención médica necesitará realizarle pruebas para controlar su salud antes y durante el tratamiento con BIKTARVY.

ANTES DE TOMAR BIKTARVY

Infórmele a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tiene o ha tenido algún problema renal o hepático, incluida la infección por hepatitis.
- Está embarazada o planea quedar embarazada.
- Está amamantando (lactando) o planea amamantar. No amamante si tiene VIH-1 debido al riesgo de transmitir el VIH-1 a su bebé.

Infórmele a su proveedor de atención médica sobre todas las medicinas que está tomando:

- Elabore una lista que incluya todas las medicinas recetadas y sin receta, antiácidos, laxantes, vitaminas y suplementos herbales, y muéstresela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico.
- Pregúntele a su proveedor de atención médica o al farmacéutico sobre las medicinas que interactúan con BIKTARVY.

CÓMO TOMAR BIKTARVY

Tome BIKTARVY 1 vez cada día con o sin alimentos.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Esto es solo un breve resumen de información importante sobre BIKTARVY. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para aprender más.
- Ingrese a BIKTARVY.com o llame al 1-800-GILEAD-5
- Si necesita ayuda para pagar su medicina, visite BIKTARVY.com para obtener información sobre el programa de asistencia.



BIKTARVY, el logotipo de BIKTARVY, DAILY CHARGE, el logotipo de DAILY CHARGE, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas. Fecha de la versión: diciembre de 2019.

© 2020 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. BYVC0253 06/20